



LANDESSUCHTKONFERENZ
BRANDENBURG
Gemeinschaftsinitiative gegen Sucht

**Arbeitskreis Daten / Berichterstattung
in der LSK**

**Suchtmonitoring
Land Brandenburg
2012**

Bearbeitung: Karin Lüdecke
Dr. Gabriele Ellsäßer

Februar 2012

**Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Abteilung Gesundheit**

Wünsdorfer Platz 3
15806 Zossen
Tel.: 033702/71106
Fax: 033702/71101
www.lugv.brandenburg.de

Suchtmonitoring - Basisdaten zur Suchtproblematik im Land Brandenburg

Seit September 2002 gibt es im Land Brandenburg die Landessuchtkonferenz. Viele Institutionen im Land arbeiten hier für die Suchtprävention und Suchthilfe zusammen. Der Arbeitskreis Daten/Berichterstattung (AK) in der Landessuchtkonferenz verfolgt das Ziel, Daten und Erkenntnisse zum Suchtbereich sowohl für die Landesebene wie auch für die Kreise und kreisfreien Städte verfügbar zu machen. Die Daten geben dem Plenum der Landessuchtkonferenz sowie allen Akteuren, Verantwortlichen und interessierten Bürgern Auskunft zum Suchtbereich. Gleichzeitig werden hier die Voraussetzungen für quantitative Gesundheitsziele geschaffen.

Das Monitoring zum Suchtbereich versteht sich als Teil der Gesundheitsbericht-erstellung und unterstützt die Planung, Steuerung und Evaluation von Maßnahmen im Suchtbereich.

Der Arbeitskreis hat dem 3. Plenum der Landessuchtkonferenz im April 2006 ein Konzept für die kontinuierliche Beobachtung des Substanzkonsums einschließlich der gesundheitlichen Folgen vorgelegt. Für das Monitoring soll ein Basisdatensatz Verwendung finden, der sich auf ein Minimum beschränkt und fundierte Aussagen ermöglicht über:

- die Entwicklung des Konsums einschließlich der gesundheitlichen Folgen sowie Eckdaten zur Versorgung von Suchtkranken
- die Begründung von quantitativen Gesundheitszielen
- die Effekte von Präventionskampagnen.

Wo es möglich ist, werden die Brandenburger Daten im Vergleich mit Bundesdaten dargestellt. Hierfür werden Daten aus verschiedenen Quellen verwendet, u.a. Mikrozensus, Befragung der Schüler in 10. Klassen (Brandenburger Jugendliche und Substanzkonsum BJS 2004/2005 und BJS 2008/2009), Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD 2003 und 2007), Krankenhausstatistik, Todesursachenstatistik und Statistik der Straßenverkehrsunfälle. Indikatoren zum Versorgungsbereich Sucht sollen später noch Eingang in das Monitoring finden.

Im AK arbeiten Vertreter aus folgenden Institutionen und Einrichtungen zusammen: kommunale Psychiatriekoordinatoren, Gesundheitsministerium, Landesgesundheitsamt, Suchtberatungsstellen, Brandenburger Landesstelle gegen die Suchtgefahren, Bildungsministerium, Suchthilfeeinrichtungen.

Im folgenden finden sich die Daten des Monitorings, dargestellt in Tabellen und Diagrammen zum Suchtbereich. Die Tabellen und Diagramme sollen alle zwei Jahre aktualisiert und fortgeschrieben werden. Das vorliegende Set ist die zweite Ausgabe.

1. Konsum von Tabak, Alkohol und Haschisch im Land Brandenburg

| Tabelle | Titel | Quelle/Datengeber | Rhythmus | Jahre |
|------------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Tabakkonsum | | | | |
| 1.1 | Rauchen in der Bevölkerung ab 15 Jahren | Mikrozensus | 2- bis 4-jährig | 1999, 2003, 2005, 2009 |
| 1.2 | Rauchen nach Alter (gegenwärtig Raucher, regelmäßig oder gelegentlich) | Mikrozensus | 2- bis 4-jährig | 1999, 2003, 2005, 2009 |
| 1.3 | Rauchen bei Schülern der 10. Klassen nach Schulform und Geschlecht | BJS Schülerbefragung | 4-jährig | 2004/2005 2008/2009 |
| Alkoholkonsum | | | | |
| 1.4 | Alkoholkonsum bei Schülern der 10. Klassen nach Schulform und Geschlecht | BJS Schülerbefragung | 4-jährig | 2004/2005 2008/2009 |
| 1.5 | Alkohol-Rauschtrinken bei Schülern der 10. Klassen nach Schulform und Geschlecht | BJS-Schülerbefragung | 4-jährig | 2004/2005 2008/2009 |
| 1.6 | Alkohol-Rauschtrinken bei Brandenburger Schülern im Vergleich mit Deutschland insgesamt | BJS Schülerbefragung, ESPAD | jeweils 4-jährig | 2004/2005 2008/2009 2003, 2007 |
| 1.7 | Alkoholkonsum in Deutschland und Brandenburg nach Alter und Geschlecht | GEDA | jährlich | 2008/2009 |
| Haschischkonsum | | | | |
| 1.8 | Haschischkonsum bei Schülern der 10. Klassen nach Schulform und Geschlecht | BJS Schülerbefragung | 4-jährig | 2004/2005 2008/2009 |

2. Gesundheitliche Folgen des Konsums in Brandenburg

| Tabelle | Titel | Quelle/Datengeber | Rhythmus | Jahre |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Lungen- und Bronchialkrebs als Folge des Rauchens | | | | |
| 2.1 | Krankenhausfälle Lungen- und Bronchialkrebs (C34) Brandenburg, Neue Länder, Deutschland, alterstandardisiert | gbe-bund.de | jährlich | 2000-2010 |
| 2.2 | Sterbeziffer Lungen- und Bronchialkrebs (C34), altersstandardisiert | gbe-bund.de | jährlich | 2000-2010 |
| alkoholbedingte Krankheiten | | | | |
| 2.3 | Krankenhausfälle alkoholbedingte Krankheiten Brandenburg, Neue Länder, Deutschland, alterstandardisiert | gbe-bund.de | jährlich | 2000-2010 |
| 2.4 | Krankenhausfälle Alkoholmissbrauch (F10) Brandenburg, Neue Länder, Deutschland, 15-Jährige bis 20-Jährige, ohne Altersstandardisierung | gbe-bund.de | jährlich | 2000-2010 |
| 2.5 | Sterbeziffer alkoholbedingte Krankheiten Brandenburg, Neue Länder, Deutschland alterstandardisiert | gbe-bund.de | jährlich | 2000-2010 |
| Taten und Unfälle unter Alkoholeinfluss | | | | |
| 2.6 | Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss | gbe-bund.de | jährlich | 1995-2010 |
| 2.7 | Alkoholbedingte Verkehrsunfälle mit Personenschaden nach Kreisen | Amt für Statistik berlin-Brandenburg | jährlich | 2002-2010 |

***1. Konsum von Tabak, Alkohol
und Haschisch im Land Brandenburg***


Rauchen in der Bevölkerung ab 15 Jahren im Vergleich mit Deutschland insgesamt

| | 1999 | 2003 | 2005 | 2009 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Brandenburg Männer | 39% | 37% | 35% | 34% |
| Deutschland Männer | 35% | 33% | 32% | 31% |
| Brandenburg Frauen | 24% | 24% | 23% | 22% |
| Deutschland Frauen | 22% | 22% | 22% | 21% |

Rauchen: gegenwärtig Tabakraucher, regelmäßig oder gelegentlich

Quelle: gbe-bund.de; LDS Mikrozensus; eigene Berechnung

Im Jahr 2014 werden die nächsten Ergebnisse zum Tabakkonsum aus dem Mikrozensus zur Verfügung stehen.




Rauchen nach Alter und Geschlecht

| Land Brandenburg | Alter in Jahren | 1999 | 2003 | 2005 | 2009 |
|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Männer | 15-19 | 39,4% | 37,0% | 32,2% | 31,8% |
| | 20-29 | 50,3% | 51,5% | 50,6% | 47,9% |
| | 30-39 | 50,9% | 48,2% | 44,2% | 45,5% |
| | 40-49 | 45,2% | 48,5% | 45,8% | 43,1% |
| | 50-59 | 33,2% | 33,3% | 33,7% | 36,0% |
| | 60-69 | 22,8% | 20,1% | 18,9% | 19,1% |
| | 70 u.ä. | 13,5% | 14,2% | 11,1% | 12,4% |
| Frauen | 15-19 | 34,8% | 32,9% | 29,7% | 22,7% |
| | 20-29 | 33,2% | 39,2% | 39,6% | 37,5% |
| | 30-39 | 40,1% | 38,1% | 34,4% | 31,2% |
| | 40-49 | 34,8% | 34,8% | 34,5% | 32,7% |
| | 50-59 | 14,3% | 18,0% | 21,2% | 24,8% |
| | 60-69 | 8,1% | 9,7% | 9,1% | 10,5% |
| | 70 u.ä. | 4,4% | 3,5% | 4,2% | 4,5% |

Rauchen: gegenwärtig Tabakraucher, regelmäßig oder gelegentlich
2009: Anteil der Raucher an der Bevölkerung mit Angaben über die Rauchgewohnheiten

Quelle: LDS Mikrozensus; eigene Berechnung
2009: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg




Rauchen bei Schülern der 10. Klassen nach Schulform und Geschlecht

| | Geschlecht | Jahr | N | täglich | wöchentlich |
|-----------------------------------|------------|---------|-------|---------|-------------|
| Oberschule | Jungen | 2004/05 | 3.037 | 38,1% | 6,5% |
| | | 2008/09 | 2.064 | 29,5% | 6,6% |
| | Mädchen | 2004/05 | 2.623 | 44,3% | 6,3% |
| | | 2008/09 | 1.866 | 34,1% | 6,0% |
| Förderschule | Jungen | 2004/05 | 317 | 45,4% | 5,4% |
| | | 2008/09 | 288 | 41,3% | 6,6% |
| | Mädchen | 2004/05 | 167 | 35,3% | 6,0% |
| | | 2008/09 | 206 | 30,1% | 6,3% |
| Gesamtschule mit Sekundarstufe II | Jungen | 2004/05 | 776 | 28,4% | 6,8% |
| | | 2008/09 | 629 | 21,8% | 5,6% |
| | Mädchen | 2004/05 | 855 | 37,2% | 6,7% |
| | | 2008/09 | 552 | 21,9% | 5,4% |
| Gymnasium | Jungen | 2004/05 | 1.661 | 15,7% | 7,0% |
| | | 2008/09 | 1.744 | 11,0% | 6,0% |
| | Mädchen | 2004/05 | 2.336 | 21,2% | 7,2% |
| | | 2008/09 | 1.935 | 8,8% | 4,8% |
| alle Schulformen | Jungen | 2004/05 | 5.791 | 30,8% | 6,6% |
| | | 2008/09 | 4.725 | 21,9% | 5,4% |
| | Mädchen | 2004/05 | 5.981 | 34,0% | 6,7% |
| | | 2008/09 | 4.559 | 22,0% | 5,8% |
| Ziel 2008 | Jungen | 2008 | | 26% | |
| | Mädchen | 2008 | | 28% | |

Quelle: LGA BJS Schülerbefragung 2004/2005 und 2008/2009

Das Ziel 2008 wurde formuliert auf dem 3. Plenum der Landessuchtконференz 2006: Reduktion des Substanzkonsums um 25% im Vergleich zu 2004/2005




Alkoholkonsum bei Schülern der 10. Klassen nach Schulform und Geschlecht

| | Geschlecht | Jahr | N | täglich | wöchentlich |
|-----------------------------------|------------|---------|-------|---------|-------------|
| Oberschule | Jungen | 2004/05 | 3.036 | 4,9% | 34,9% |
| | | 2008/09 | 2.065 | 1,7% | 29,6% |
| | Mädchen | 2004/05 | 2.616 | 0,5% | 17,7% |
| | | 2008/09 | 1.856 | 0,6% | 16,1% |
| Förderschule | Jungen | 2004/05 | 316 | 2,5% | 17,4% |
| | | 2008/09 | 287 | 3,5% | 15,0% |
| | Mädchen | 2004/05 | 168 | 1,8% | 10,1% |
| | | 2008/09 | 204 | 1,0% | 7,4% |
| Gesamtschule mit Sekundarstufe II | Jungen | 2004/05 | 775 | 2,7% | 25,2% |
| | | 2008/09 | 632 | 1,3% | 27,4% |
| | Mädchen | 2004/05 | 853 | 0,4% | 16,4% |
| | | 2008/09 | 554 | 0,4% | 12,1% |
| Gymnasium | Jungen | 2004/05 | 1.666 | 1,1% | 31,3% |
| | | 2008/09 | 1.743 | 1,0% | 26,3% |
| | Mädchen | 2004/05 | 2.345 | 0,3% | 18,8% |
| | | 2008/09 | 1.938 | 0,3% | 10,2% |
| alle Schulformen | Jungen | 2004/05 | 5.793 | 2,4% | 31,6% |
| | | 2008/09 | 4.727 | 1,5% | 27,2% |
| | Mädchen | 2004/05 | 5.982 | 0,4% | 17,7% |
| | | 2008/09 | 4.552 | 0,5% | 12,7% |
| Ziel 2008 | Jungen | 2008 | | | 25% |
| | Mädchen | 2008 | | | 12% |

Quelle: LGA BJS Schülerbefragung 2004/2005 und 2008/2009


Das Ziel 2008 wurde formuliert auf dem 3. Plenum der Landessuchtkonferenz 2006: Reduktion des Substanzkonsums um 25% im Vergleich zu 2004/2005




Alkohol-Rauschtrinken bei Schülern der 10. Klassen nach Schulform und Geschlecht

| | Geschlecht | Jahr | N | trifft nicht zu/nie | an 1-2 Tagen | an 3-9 Tagen | an 10 Tagen und öfter |
|---------------------------------|------------|---------|-------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Oberschule | Jungen | 2004/05 | 1.652 | 21,5% | 35,7% | 33,5% | 9,3% |
| | | 2008/09 | 2.046 | 25,0% | 37,8% | 28,5% | 8,7% |
| | Mädchen | 2004/05 | 1.362 | 28,9% | 44,6% | 23,4% | 3,1% |
| | | 2008/09 | 1.856 | 28,2% | 47,0% | 21,6% | 3,2% |
| Förderschule | Jungen | 2004/05 | 267 | 28,8% | 39,6% | 23,0% | 8,6% |
| | | 2008/09 | 289 | 28,4% | 39,1% | 25,6% | 6,9% |
| | Mädchen | 2004/05 | 141 | 35,2% | 41,2% | 20,6% | 3,0% |
| | | 2008/09 | 204 | 36,3% | 43,6% | 18,1% | 2,0% |
| Gesamtschule mit gym. Oberstufe | Jungen | 2004/05 | 740 | 31,0% | 35,0% | 26,8% | 7,3% |
| | | 2008/09 | 627 | 25,5% | 40,4% | 26,6% | 7,5% |
| | Mädchen | 2004/05 | 820 | 34,4% | 42,7% | 20,6% | 2,2% |
| | | 2008/09 | 551 | 34,8% | 44,3% | 17,1% | 3,8% |
| Gymnasium | Jungen | 2004/05 | 1.340 | 33,0% | 34,8% | 27,4% | 4,9% |
| | | 2008/09 | 1.739 | 35,6% | 34,8% | 24,4% | 5,2% |
| | Mädchen | 2004/05 | 1.865 | 38,0% | 40,0% | 19,7% | 2,3% |
| | | 2008/09 | 1.926 | 44,7% | 40,2% | 13,7% | 1,3% |
| alle Schulformen | Jungen | 2004/05 | 5.769 | 26,5% | 35,6% | 30,3% | 7,7% |
| | | 2008/09 | 4.701 | 29,2% | 37,1% | 26,6% | 7,1% |
| | Mädchen | 2004/05 | 5.964 | 33,4% | 42,4% | 21,5% | 2,6% |
| | | 2008/09 | 4.537 | 36,4% | 43,6% | 17,5% | 2,4% |

Alkohol-Rauschtrinken: mehr als 5 Drinks an ... Tagen im letzten Monat
Quelle: LGA BJS Schülerbefragung 2004/2005 und 2008/09



Alkohol-Rauschtrinken bei Brandenburger Schülern im Vergleich mit Deutschland insgesamt



Alkoholkonsum bei Erwachsenen (18 Jahre und älter) nach Geschlecht

| | Geschlecht | N | Nie-Trinker | Moderater Alkoholkonsum | Risiko-Konsum |
|------------------|------------|--------|-------------|-------------------------|---------------|
| Land Brandenburg | Männer | 970 | 13% | 52% | 36% |
| | Frauen | 1.359 | 20% | 62% | 18% |
| Neue Länder | Männer | 1.702 | 11% | 51% | 38% |
| | Frauen | 2.315 | 24% | 56% | 20% |
| Deutschland | Männer | 9.052 | 13% | 53% | 34% |
| | Frauen | 12.023 | 25% | 54% | 22% |


Quelle: Gesundheit in Deutschland Aktuell (GEDA) 2008/2009

GEDA Gesundheit in Deutschland aktuell

Jährlich durchgeführte Querschnittsbefragungen der erwachsenen Wohnbevölkerung im Alter von über 18 Jahren.

GEDA erfasst unter Anderem den gesundheitsgefährdenden Alkoholkonsum nach internationalem Standard (Audit C) über drei Fragenkomplexe: der Häufigkeit des Konsums, der durchschnittlichen Menge pro Trinkgelegenheit („Durchschnittskonsum“) und der Häufigkeit von größeren Trinkmengen (variabler Konsum, Rauschtrinken). Über einen Summenscore der Antworten werden die Konsumentengruppen in „Nie-Trinker“ (kein oder äußerst seltener Konsum), „Moderate Konsumenten“ (risikoarmer Konsum) und „Risikokonsumenten“ (Risikokonsum) eingeteilt (Bush et al. 1998). Der Risikokonsum umfasst all die Konsummengen und Konsummuster, die fortgesetzt die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung der Gesundheit erhöhen (Rist et al. 2004).

Nach dem Audit C gelten Frauen als Risikokonsumenten, wenn sie beispielsweise zwei bis drei Mal in der Woche jeweils drei bis vier alkoholische Getränke (0,33 l Bier oder 0,125 l Wein) zu sich nehmen. Männer gelten als Risikokonsumenten, wenn sie diese Menge mindestens vier Mal in der Woche zu sich nehmen.




Haschischkonsum bei Schülern der 10. Klassen nach Schulform und Geschlecht

| | Geschlecht | Jahr | N | täglich | wöchentlich |
|-----------------------------------|------------|---------|-------|---------|-------------|
| Oberschule | Jungen | 2004/05 | 3.007 | 1,7% | 3,1% |
| | | 2008/09 | 2.040 | 1,5% | 2,5% |
| | Mädchen | 2004/05 | 2.604 | 0,8% | 1,3% |
| | | 2008/09 | 1.832 | 0,8% | 1,4% |
| Förderschule | Jungen | 2004/05 | 307 | 2,0% | 2,3% |
| | | 2008/09 | 287 | 0,3% | 1,7% |
| | Mädchen | 2004/05 | 166 | 1,2% | 1,2% |
| | | 2008/09 | 204 | 1,0% | 1,0% |
| Gesamtschule mit Sekundarstufe II | Jungen | 2004/05 | 773 | 2,7% | 3,2% |
| | | 2008/09 | 625 | 1,8% | 2,1% |
| | Mädchen | 2004/05 | 846 | 0,5% | 1,1% |
| | | 2008/09 | 554 | 0,4% | 1,1% |
| Gymnasium | Jungen | 2004/05 | 1.653 | 1,3% | 3,0% |
| | | 2008/09 | 1.736 | 0,5% | 1,8% |
| | Mädchen | 2004/05 | 2.324 | 0,4% | 1,2% |
| | | 2008/09 | 1.927 | 0,2% | 1,0% |
| alle Schulformen | Jungen | 2004/05 | 5.740 | 1,7% | 3,0% |
| | | 2008/09 | 4.688 | 1,1% | 2,2% |
| | Mädchen | 2004/05 | 5.940 | 0,6% | 1,2% |
| | | 2008/09 | 4.517 | 0,5% | 1,2% |
| Ziel 2008 | Jungen | 2008 | | | 2% |
| | Mädchen | 2008 | | | 1% |

Quelle: LGA BJS Schülerbefragung 2004/2005 und 2008/09

Das Ziel 2008 wurde formuliert auf dem 3. Plenum der Landessuchtkonferenz 2006: Reduktion des Substanzkonsums um 25% im Vergleich zu 2004/2005



2. Gesundheitliche Folgen des Konsums in Brandenburg

**Krankenhausfälle aufgrund von Lungen- und Bronchialkrebs (C 34)
je 100.000 Einwohner, altersstandardisiert,
Brandenburg, Neue Länder, Deutschland nach Geschlecht**


| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Brandenburg Männer | 428 | 421 | 386 | 372 | 369 | 375 | 383 | 358 | 313 | 309 | 308 |
| Neue Länder Männer | 355 | 345 | 326 | 289 | 295 | 304 | 306 | 302 | 282 | 278 | 266 |
| Deutschland Männer | 281 | 268 | 254 | 233 | 240 | 249 | 249 | 245 | 238 | 231 | 227 |
| Brandenburg Frauen | 93 | 97 | 86 | 93 | 96 | 103 | 104 | 102 | 111 | 102 | 109 |
| Neue Länder Frauen | 72 | 68 | 70 | 65 | 72 | 77 | 77 | 83 | 84 | 80 | 84 |
| Deutschland Frauen | 85 | 84 | 84 | 79 | 86 | 96 | 98 | 104 | 104 | 103 | 105 |
| Krankenhausfälle absolut | | | | | | | | | | | |
| Brandenburg Männer | 6.243 | 6.410 | 6.078 | 5.991 | 6.110 | 6.362 | 6.694 | 6.413 | 5.715 | 5.819 | 5.987 |
| Brandenburg Frauen | 1.702 | 1.797 | 1.590 | 1.762 | 1.830 | 2.006 | 2.002 | 2.062 | 2.153 | 2.053 | 2.183 |

altersstandardisiert: Alte Europa Standardbevölkerung

Neue Länder ohne Berlin-Ost

Krankenhausfälle absolut: gesamte Liegedauer, alle Nationalitäten

Quelle: gbe-bund.de Krankenhausdiagnosestatistik



**Sterbeziffer aufgrund von Lungen- und Bronchialkrebs (C 34)
je 100.000 Einwohner, altersstandardisiert,
Brandenburg, Neue Länder, Deutschland nach Geschlecht**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Brandenburg Männer | 81,3 | 73,2 | 71,9 | 68,7 | 62,6 | 63,5 | 61,9 | 60,9 | 55,0 | 54,5 | 51,6 |
| Neue Länder Männer | 70,0 | 66,7 | 64,1 | 62,4 | 58,9 | 58,9 | 56,9 | * | * | * | * |
| Deutschland Männer | 62,6 | 59,7 | 58,7 | 57,2 | 55,9 | 54,7 | 53,7 | 52,7 | 52,3 | 50,6 | 49,8 |
| Brandenburg Frauen | 14,9 | 15,4 | 13,4 | 13,8 | 14,7 | 14,8 | 15,1 | 13,7 | 15,7 | 14,8 | 16,2 |
| Neue Länder Frauen | 12,1 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 13,1 | 12,6 | * | * | * | * |
| Deutschland Frauen | 15,6 | 15,8 | 16,3 | 16,5 | 17,0 | 17,9 | 18,0 | 18,5 | 19,2 | 19,3 | 19,8 |

Sterbefälle absolut


| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Brandenburg Männer | 1.125 | 1.056 | 1.086 | 1.066 | 1.005 | 1.055 | 1.065 | 1.080 | 1.005 | 1.021 | 1.002 |
| Brandenburg Frauen | 302 | 313 | 284 | 294 | 322 | 332 | 333 | 305 | 365 | 339 | 364 |

altersstandardisiert: Alte Europa Standardbevölkerung

Neue Länder ohne Berlin-Ost

*keine Angaben mehr verfügbar (seit 10/2008)

Quelle: gbe-bund.de, Todesursachenstatistik



**Krankenhausfälle aufgrund von alkoholbedingten Krankheiten
je 100.000 Einwohner, altersstandardisiert,
Brandenburg, Neue Länder, Deutschland nach Geschlecht**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Brandenburg Männer | 718 | 712 | 694 | 667 | 704 | 707 | 714 | 744 | 740 | 743 | 723 |
| Neue Länder Männer | 737 | 736 | 702 | 696 | 700 | 743 | 767 | 795 | 833 | 859 | 826 |
| Deutschland Männer | 557 | 562 | 554 | 554 | 559 | 575 | 598 | 623 | 656 | 669 | 656 |
| Brandenburg Frauen | 172 | 166 | 155 | 163 | 169 | 186 | 179 | 197 | 199 | 205 | 198 |
| Neue Länder Frauen | 175 | 169 | 166 | 170 | 176 | 185 | 195 | 215 | 226 | 233 | 236 |
| Deutschland Frauen | 182 | 185 | 185 | 189 | 195 | 204 | 214 | 227 | 239 | 245 | 243 |
| Krankenhausfälle absolut | | | | | | | | | | | |
| Brandenburg Männer | 10.704 | 10.630 | 10.389 | 10.008 | 10.528 | 10.571 | 10.711 | 11.058 | 10.908 | 10.807 | 10.400 |
| Brandenburg Frauen | 2.480 | 2.428 | 2.253 | 2.375 | 2.430 | 2.658 | 2.546 | 2.762 | 2.739 | 2.754 | 2.675 |

altersstandardisiert: Alte Europa Standardbevölkerung

Neue Länder ohne Berlin-Ost


Krankenhausfälle absolut: gesamte Liegedauer, alle Nationalitäten

Alkoholbedingte Krankheiten:

Der Großteil der alkoholbedingten Sterbefälle geht auf folgende Diagnosen zurück:

Alkoholische Leberkrankheit (K70) und Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10).

Quelle: gbe-bund.de, Krankenhausstatistik



**Krankenhausfälle aufgrund von alkoholbedingten Krankheiten
je 100.000 Einwohner, Altersgruppe: 15 bis unter 20 Jahre,
Brandenburg, Neue Länder, Deutschland nach Geschlecht**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Brandenburg Männer | 207 | 257 | 287 | 276 | 318 | 384 | 409 | 514 | 495 | 557 | 544 |
| Neue Länder Männer | 239 | 288 | 313 | 330 | 390 | 465 | 515 | 597 | 692 | 718 | 743 |
| Deutschland Männer | 305 | 340 | 367 | 382 | 422 | 478 | 532 | 619 | 674 | 724 | 732 |
| Brandenburg Frauen | 97 | 124 | 144 | 161 | 189 | 196 | 197 | 245 | 243 | 261 | 294 |
| Neue Länder Frauen | 130 | 137 | 155 | 169 | 202 | 233 | 254 | 302 | 328 | 341 | 362 |
| Deutschland Frauen | 171 | 188 | 212 | 213 | 239 | 274 | 297 | 348 | 381 | 396 | 409 |

Krankenhausfälle absolut

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Brandenburg Männer | 206 | 255 | 282 | 269 | 306 | 359 | 356 | 397 | 328 | 311 | 257 |
| Brandenburg Frauen | 90 | 114 | 132 | 147 | 170 | 172 | 161 | 178 | 151 | 137 | 130 |

Neue Länder ohne Berlin-Ost


Krankenhausfälle absolut: gesamte Liegedauer, alle Nationalitäten

Alkoholbedingte Krankheiten:

Der Großteil der alkoholbedingten Sterbefälle geht auf folgende Diagnosen zurück:

Alkoholische Leberkrankheit (K70) und Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10).

Quelle: gbe-bund.de, Krankenhausdiagnosestatistik



**Sterbefälle aufgrund von alkoholbedingten Krankheiten
je 100.000 Einwohner, altersstandardisiert,
Brandenburg, Neue Länder, Deutschland nach Geschlecht**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Brandenburg Männer | 47,7 | 46,6 | 41,1 | 43 | 43 | 39,1 | 37,5 | 36,1 | 31,9 | 29,5 | 29,0 |
| Neue Länder Männer | 47,7 | 44,9 | 44,5 | 44,4 | 43,9 | 42 | 39,0 | * | * | * | * |
| Deutschland Männer | 27,6 | 26,8 | 27,6 | 27,3 | 25,9 | 25,6 | 23,9 | 22,7 | 22,5 | 21,7 | 22,1 |
| Brandenburg Frauen | 14,1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10,5 | 10,3 | 8,3 | 7,8 | 6,6 | 9,3 |
| Neue Länder Frauen | 12,4 | 11,2 | 10,8 | 11,1 | 9,8 | 10,4 | 9,5 | * | * | * | * |
| Deutschland Frauen | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8 | 8 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,9 | 7,1 |
| Sterbefälle absolut | | | | | | | | | | | |
| Brandenburg Männer | 704 | 700 | 635 | 673 | 671 | 628 | 606 | 597 | 535 | 502 | 490 |
| Brandenburg Frauen | 221 | 189 | 177 | 171 | 177 | 173 | 173 | 143 | 133 | 115 | 156 |

altersstandardisiert: Alte Europa Standardbevölkerung


Neue Länder ohne Berlin-Ost

*keine Angaben mehr verfügbar (seit 10/2008)

Alkoholbedingte Krankheiten:

Der Großteil der alkoholbedingten Sterbefälle geht auf folgende Diagnosen zurück:
Alkoholische Leberkrankheit (K70) und Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10).

Quelle: gbe-bund.de, Todesursachenstatistik



**Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss
je 100.000 Einwohner
Brandenburg, Neue Länder, Deutschland**


| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Brandenburg | 45 | 41 | 39 | 35 | 32 | 31 | 29 | 29 | 24 | 21 | 20 |
| Neue Länder* | 40 | 37 | 37 | 33 | 31 | 31 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 |
| Deutschland | 33 | 31 | 31 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 21 | 18 |

| Unfälle absolut | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Brandenburg | 1.160 | 1.067 | 1.003 | 894 | 829 | 807 | 739 | 726 | 603 | 532 | 505 |

* Neue Länder ohne Berlin-Ost

Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss: sind Unfälle, bei denen mindestens ein Unfallbeteiligter unter Alkohol gestanden hat und bei denen Personen verletzt oder getötet wurden.

Quelle: gbe-bund.de




Alkohol beim Fahrzeugführer als polizeilich festgestellte Unfallursache bei Unfällen mit Personenschaden in Brandenburg nach Kreisen

| Kreisfreie Stadt/ Landkreis | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Brandenburg an der Havel | 19 | 19 | 15 | 14 | 18 | 7 | 15 | 13 | 7 |
| Cottbus | 25 | 31 | 34 | 33 | 26 | 19 | 10 | 15 | 16 |
| Frankfurt | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| Potsdam | 28 | 23 | 27 | 24 | 23 | 25 | 21 | 19 | 23 |
| Barnim | 62 | 60 | 50 | 55 | 53 | 56 | 38 | 33 | 36 |
| Dahme-Spreewald | 81 | 69 | 74 | 58 | 54 | 64 | 40 | 50 | 41 |
| Elbe-Elster | 32 | 42 | 38 | 50 | 37 | 43 | 21 | 28 | 23 |
| Havelland | 55 | 48 | 36 | 50 | 42 | 43 | 26 | 34 | 27 |
| Märkisch-Oderland | 85 | 71 | 67 | 56 | 52 | 46 | 31 | 33 | 35 |
| Oberhavel | 74 | 58 | 59 | 52 | 57 | 40 | 47 | 38 | 35 |
| Oberspreewald- Lausitz | 49 | 41 | 49 | 38 | 30 | 30 | 22 | 25 | 23 |
| Oder-Spree | 62 | 46 | 42 | 44 | 45 | 48 | 44 | 41 | 38 |
| Ostprignitz-Ruppin | 52 | 42 | 28 | 42 | 28 | 19 | 35 | 24 | 26 |
| Potsdam-Mittelmark | 66 | 60 | 66 | 60 | 44 | 66 | 61 | 34 | 37 |
| Prignitz | 37 | 33 | 26 | 26 | 20 | 19 | 24 | 19 | 17 |
| Spree-Neiße | 53 | 49 | 57 | 50 | 45 | 41 | 32 | 27 | 31 |
| Teltow-Fläming | 72 | 61 | 45 | 42 | 52 | 39 | 40 | 44 | 36 |
| Uckermark | 56 | 62 | 46 | 44 | 43 | 50 | 43 | 23 | 26 |
| insgesamt | 921 | 824 | 768 | 745 | 676 | 667 | 557 | 505 | 486 |

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Stat. Berichte

Unfälle mit Personenschaden: Unfälle, bei denen Personen verletzt oder getötet wurden



Abkürzungen

| | |
|-------------|--|
| BJS | Brandenburger Jugendliche und Substanzkonsum, Studie bei Schülern der 10. Klassen |
| C 34 | Diagnose: Bösartige Neubildung der Bronchien u. der Lunge. ICD10, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, Weltgesundheitsorganisation (WHO) |
| ESPAD | Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen nach Kraus et. al. (2003 und 2007). Die europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen. München |
| F 10 | Diagnose: Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol. CD10, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, Weltgesundheitsorganisation (WHO) |
| gbe-bund.de | Gesundheitsberichterstattung (GBE) des Bundes. Bietet statistische Daten und Hintergrundinformationen zu allen Bereichen des deutschen Gesundheitswesens |
| ICD | International Classification of Diseases; Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation WHO |
| LASV | Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg |
| LDS | Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg. |
| LGA | Landesgesundheitsamt Brandenburg im LASV |
| K 70 | Diagnose: Alkoholische Leberkrankheit. ICD10, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, Weltgesundheitsorganisation (WHO). |

Definitionen

alkoholbedingte Krankheiten:

die alkoholbedingten Krankheiten umfassen verschiedene Diagnosen. Der Großteil der alkoholbedingten Sterbefälle geht dabei auf die folgenden Diagnosen zurück:

- Alkoholische Leberkrankheit (K70)
- Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10).

Altersstandardisierung:

Hierbei wird eine Bezugsbevölkerung der Altersstruktur einer Referenzpopulation, der so genannten Standardbevölkerung (hier: Alte Europa Standardbevölkerung) unterstellt. Dabei werden die altersspezifischen Mortalitäts- oder Morbiditätsraten der Bezugsbevölkerung entsprechend dem Altersaufbau der Standardbevölkerung gewichtet.

Nach einer Altersstandardisierung können Daten unterschiedlicher Jahre oder Regionen miteinander verglichen werden, ohne dass es zu Verzerrungen aufgrund unterschiedlicher Altersstrukturen kommt.

Standardbevölkerung:

Standardbevölkerungen bezeichnen "künstliche Bevölkerungen" mit fiktiven Altersstrukturen, die als einheitliche Basis zur Berechnung von vergleichbaren Maßzahlen für die jeweilige(n) Bezugsbevölkerung(en) bei der Altersstandardisierung verwendet werden.

Die alte Europastandardbevölkerung unterstellt den Gruppen der Frauen und Männer eine identische Altersstruktur (Alters- und Geschlechtsstandardisierung), weshalb sie sich nur bei geschlechtsspezifischen Vergleichen empfiehlt.